



NPN 01910531

**Gel topique
à 1,23 % de
fluorure**



75 utilisations par bouteille

- Une absorption de fluorure rapide en 60 secondes
- Traitement au fluorure recommandé pour les adultes¹
- Application avec un porte-fluor ou une brosse à dents

Sans alcool **Sans colorant** **Sans gluten**

PROBLÈMES DE LA PATIENTÈLE

- Caries chez les enfants de plus de 6 ans*
- Caries coronaires chez les adultes

Pour arrêter ou réparer les lésions carieuses non cavitaires sur les surfaces occlusales, vestibulaires ou linguales des dents de lait et permanentes, le comité de spécialistes de l'ADA suggère aux cliniciens et cliniciennes d'utiliser du gel contenant 1,23 % de fluorure de phosphate acidulé (tous les 3 à 6 mois).¹

Efficace	Un gel topique anticariieux de fluorure de phosphate acidulé contenant 1,23 % d'ion fluorure fait de fluorure de sodium et d'acide fluorhydrique à faible pH
	Recommandé pour les enfants et les adultes sans restaurations dentaires en composite ou en porcelaine, couronnes ou ponts
	Forte adhésion à l'émail et aux zones interproximales
Adapté à la patientèle	Le gel thixotrope réduit les risques de réflexe nauséux ou d'ingestion chez la patientèle et maximise le contact avec toutes les surfaces des dents
	Des saveurs agréables pour la patientèle



450 ml



MENTHE

Article n° : G6-SP



FRAISE

Article n° : G6-S



Fabriqué au
Canada

Pour commander 60 Second Gel ou pour plus de renseignements, contactez votre gestionnaire de compte ou Germiphene au 1 800 265-9931 | info@germiphene.com | www.germiphene.com

1. ADA, « Evidence-Based Clinical Practice Guideline on Nonrestorative Treatments for Carious Lesions: A report from the American Dental Association », 2018.

* Faire preuve de prudence avec les jeunes enfants. Les gels de fluorure ne doivent pas être avalés.