

Neutragel

Gel à 1,1 % de fluorure de sodium neutre

Un traitement au fluorure doux et efficace conçu spécifiquement pour la patientèle « à risque ».

- Convient à la patientèle traitée par chimiothérapie et par radiation ou atteinte de xérostomie
- Sans saveur, sans sucre, sans colorant et sans alcool
- Ne laisse pas d'arrière-goût amer
- Base en gel stable
- Doux en bouche
- Combat les caries

Les centres anticancéreux dans l'ensemble du pays **recommandent une concentration de 1,1 % de fluorure de sodium neutre.**¹



Fabriqué au Canada



Efficace	L'utilisation quotidienne d'un traitement au fluorure à pH neutre (Neutragel) aide à prévenir les caries. ²
	Le fluorure de sodium est l'agent le plus utilisé sous forme de gel, de rince-bouche ou de vernis pour prévenir les caries causées par la radiation. ³
Sécuritaire	Neutragel a un effet doux sur les couronnes, les ponts, les restaurations en composite et les autres restaurations esthétiques.
	Neutragel peut être utilisé tous les jours (ou tel que prescrit).
	Neutragel n'égratigne pas les restaurations en porcelaine ou en céramique.

1. BC Cancer, 2003, « 17 Patients Following Radiation Therapy », [bccancer.bc.ca], UHN, décembre 2022, « Taking Care of Your Mouth During Cancer Treatment », [uhn.ca] et Princess Margaret Cancer Centre, « Head and Neck Cancer », [pmhdentaloncology.ca]. 2. UHN, décembre 2022, « Taking Care of Your Mouth During Cancer Treatment », [uhn.ca]. 3. Science Direct, juin 2022, vol. 129 « Effectiveness of topical fluorides in prevention of radiation caries in adults: A systematic review and meta-analysis », [sciencedirect.com]



Gel à 1,1 % de fluorure de sodium neutre

INSTRUCTIONS POUR LA PATIENTÈLE UTILISANT UN SUPPLÉMENT DE FLUORURE

Utilisation d'un porte-fluor :

- Placer un léger filet de gel de fluorure dans chaque côté du porte-fluor.
- Placer le porte-fluor sur les dents et le laisser en place pendant quatre minutes. Si le gel déborde du porte-fluor, cela signifie que vous en avez trop utilisé.
- Après quatre minutes, retirer le porte-fluor et cracher l'excédent de gel.
- Rincer le porte-fluor à l'eau.
- Ne pas manger, boire ou rincer pendant 30 minutes.

Méthode d'application à la brosse :

- Se brosser les dents avec du dentifrice, puis rincer comme à l'habitude.
- Placer un léger filet de gel de fluorure sur la brosse à dents.
- Brosser de deux à trois minutes.
- Cracher l'excédent de gel.
- Ne pas manger, boire ou rincer pendant 30 minutes.⁴

Pour commander Neutragel ou pour obtenir de plus amples informations, contactez votre gestionnaire de comptes ou Germiphene au 1 800 265-9931. info@germiphene.com | www.germiphene.com



4. Oral Health, Cancer Care and You Fitting the Pieces Together, US Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, publication no 02-4372.